4.7.2 Bernoulli-Exercice 4

Une digue isole un bassin de retenue de la mer. La surface du bassin est S . A la base de la digue, une canalisation de section s met en communication le bassin et la mer.

La hauteur d'eau dans la mer est : $y(t) = \frac{h}{2} \left(1 - \cos \frac{2\pi t}{P}\right)$

La hauteur d'eau dans le bassin est $x(t)$.

A l'entrée de la canalisation, l'écoulement est laminaire. A la sortie l'écoulement est turbulent. On admet que la pression dans la canalisation est égale à la pression au fond du côté récepteur, calculée selon la statique des fluides.

a-Calculer en fonction de x et y la vitesse dans la canalisation et le débit correspondant.

b-En déduire l'équation différentielle en $x(t)$.

c-On donne : $h = 10$ m ; $S = 10^5$ m² ; $s = 3$ m² ; $P = 12$ heures. La résolution conduit au tracé ci-contre de $x(t)$. Identifier $x(t)$ et $y(t)$ et commenter.

d-On modélise $x(t)$ par $x(t) = H \left(1 - a \cos \left(\frac{2\pi t}{P'} - \varphi\right)\right)$. Donner la signification des grandeurs H , P' , a et φ .

Evaluer leurs valeurs d'après la courbe.

4.7.2 Bernoulli-Exercice 4

a- Cas $y > x$ (récepteur = retenue) :

Ecoulement parfait (car c'est de l'eau), incompressible (car c'est un liquide), quasi-stationnaire (car grande quantité d'eau).

Relation de Bernoulli pour la ligne de courant AB :

$$P_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 + \rho g z_A = P_B + \frac{1}{2}\rho v_B^2 + \rho g z_B$$

Avec :

- $P_A = P_{atm}$
- $v_A \approx 0$
- $z_A = y$
- $P_B = P_{atm} + \rho g x$ (pression statique coté récepteur)
- $z_B = 0$

D'où : $v_B = \sqrt{2g(y-x)}$ puis $q_v = s\sqrt{2g(y-x)}$

Cas $y < x$ (récepteur = mer) : de la même façon $q_v = s\sqrt{2g(x-y)}$

b-Ecoulement incompressible => conservation du débit volumique

Cas $y > x$: x croît au cours du temps $S \frac{dx}{dt} = s\sqrt{2g(y-x)}$

Cas $x > y$: x décroît au cours du temps $S \frac{dx}{dt} = -s\sqrt{2g(x-y)}$

c-grande courbe sinusoïdale : y petite courbe : x

Après un régime transitoire, x varie sinusoïdalement comme y : c'est le régime sinusoïdal forcé.

La période est de 12 h à cause des marées.

d- H = hauteur moyenne dans le bassin = 5 m

P' = période = 12 h

Ha = amplitude des variations de x autour de la moyenne = 2 m d'où a = 0,4

φ = retard de phase de x par rapport à y $\approx 80^\circ$ (les courbes sont décalées d'environ 2 mm et la période vaut environ 9 mm => $360.2/9 = 80$)