

# Fonctions vectorielles de la variable réelle

Dans ce chapitre  $I$  désigne un intervalle d'intérieur non vide,  $a$  un point de  $I$  et  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non nulle.

On s'intéresse aux fonctions définies de  $I$  dans  $E$ .

## I Dérivation

### I. A Dérivée en un point

#### Définition 1.1

On appelle **taux d'accroissement en  $a$**  l'application :

$$\tau_a(f) : I \setminus \{a\} \longrightarrow E$$

$$t \longmapsto \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$$

L'application  $f$  est dite **dérivable en  $a$**  lorsque son taux d'accroissement en  $a$  admet une limite dans  $E$  quand  $t$  tend vers  $a$ . Dans ce cas cette limite est appelée **dérivée de  $f$  en  $a$**  et elle est notée  $f'(a)$ .

**Remarque 1.2 :** La fonction taux d'accroissement étant à valeurs dans un espace vectoriel normé, une limite éventuelle est nécessairement finie.

#### Théorème 1.3

La fonction  $f$  est dérivable en  $a \in I$  si et seulement si il existe  $\ell \in E$  et une fonction  $\varepsilon : I \rightarrow E$  telle que :

$$\forall t \in I, f(t) = f(a) + (t - a)\ell + (t - a)\varepsilon(t), \text{ avec } \varepsilon(t) \xrightarrow{t \rightarrow a} 0_E,$$

et dans ce cas  $\ell = f'(a)$ .

**Interprétation cinématique :** Si  $f$  désigne la position d'un point en fonction du temps, le vecteur  $f'(a)$  représente la vitesse instantanée du point à l'instant  $a$ .

#### Proposition 1.4

Si la fonction  $f$  est dérivable en  $a$ , alors elle est continue en  $a$ .

**Notation :** Si  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  est une base de  $E$ , on appelle **fonctions coordonnées** de  $f : I \rightarrow E$  dans la base  $\mathcal{B}$  les fonctions  $f_1, \dots, f_n$  définies de  $I$  dans  $\mathbb{K}$  telles que :

$$\forall t \in I, f(t) = \sum_{k=1}^n f_k(t)e_k.$$

**Rappel :** Une fonction  $f : I \rightarrow E$  est continue en  $a \in I$  si et seulement si chacune de ses fonctions coordonnées est continue en  $a$ .

#### Proposition 1.5

Soit  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$  et  $f : I \rightarrow E$ .

La fonction  $f$  est dérivable en  $a$  si et seulement si chacune de ses fonctions coordonnées dans la base  $\mathcal{B}$  est dérivable en  $a$ .

Dans ce cas, si l'on note  $f_k$  ces fonctions coordonnées :

$$f'(a) = \sum_{k=1}^n f'_k(a)e_k.$$

**Remarques 1.6 :** • On retrouve ainsi que  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$  est dérivable en  $a$  si et seulement si les fonctions  $\operatorname{Re} f$  et  $\operatorname{Im} f$  le sont : ce sont les fonctions coordonnées de  $f$  dans la base  $(1, i)$  du  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $\mathbb{C}$ .

- En particulier pour  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  avec  $f = (f_1, \dots, f_n)$ ,  $f$  est dérivable en  $a$  si et seulement si  $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, f_i$  est dérivable en  $a$  et dans ce cas,  $f'(a) = (f'_1(a), \dots, f'_n(a))$ .

#### Définition 1.7

- Si  $a$  n'est pas l'extrémité droite de  $I$ ,  $f$  est dite **dérivable à droite** en  $a$  lorsque la restriction de  $f$  à  $I \cap [a; +\infty[$  est dérivable en  $a$ .

Dans ce cas on appelle **dérivée à droite** en  $a : (f|_{I \cap [a; +\infty[})'(a)$ , notée  $f'_d(a)$ .

- Si  $a$  n'est pas l'extrémité gauche de  $I$ ,  $f$  est dite **dérivable à gauche** en  $a$  lorsque la restriction de  $f$  à  $I \cap ]-\infty; a]$  est dérivable en  $a$ .

Dans ce cas on appelle **dérivée à gauche** en  $a : (f|_{I \cap ]-\infty; a]})'(a)$ , notée  $f'_g(a)$ .

#### Proposition 1.8

Soit  $a$  un point intérieur de  $I$  et  $f : I \rightarrow E$ .

La fonction  $f$  est dérivable en  $a$  si et seulement si elle est dérivable à gauche et à droite en  $a$  et  $f'_g(a) = f'_d(a)$ ; et dans ce cas  $f'(a) = f'_g(a) = f'_d(a)$ .

## I. B Fonction dérivée

### Définition 1.9

Une fonction  $f : I \rightarrow E$  est dite **dérivable** sur  $I$  lorsqu'elle est dérivable en tout point de  $I$ .

On appelle **dérivée de  $f$**  et on note  $f'$  la fonction  $t \mapsto f'(t)$ .

### Proposition 1.10

Soit  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ . La fonction  $f : I \rightarrow E$  est dérivable sur  $I$  si et seulement si ses fonctions coordonnées dans  $\mathcal{B}$  sont dérivables sur  $I$ .

Dans ce cas, les fonctions coordonnées de  $f'$  sont les dérivées des fonctions coordonnées de  $f$ .

### Théorème 1.11

Une fonction  $f : I \rightarrow E$  est constante sur l'intervalle  $I$  si et seulement si elle est dérivable sur  $I$  et que sa dérivée est nulle sur  $I$ .

## I. C Opérations sur les fonctions dérivables

### Proposition 1.12

Soit  $f : I \rightarrow E$  et  $g : I \rightarrow E$  deux fonctions dérivables en  $a \in I$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ . Alors  $\lambda f + \mu g$  est dérivable en  $a$  et :

$$(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a).$$

### Proposition 1.13

Soit  $f : I \rightarrow E$  et  $g : I \rightarrow E$  deux fonctions dérivables sur  $I$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ . Alors  $\lambda f + \mu g$  est dérivable sur  $I$  et :

$$(\lambda f + \mu g)' = \lambda f' + \mu g'.$$

**Remarque 1.14 :** L'ensemble  $\mathcal{D}(I, E)$  des fonctions dérivables sur  $I$  à valeurs dans  $E$  est donc un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{F}(I, E)$  et  $f \mapsto f'$  est une application linéaire de  $\mathcal{D}(I, E)$  dans  $\mathcal{F}(I, E)$ .

### Proposition 1.15

Soit  $L$  une application linéaire de  $E$  dans un espace vectoriel  $F$  de dimension finie. Si  $f$  est dérivable en  $a \in I$ , alors  $L \circ f$  est dérivable en  $a$  et :

$$(L \circ f)'(a) = L(f'(a)).$$

### Proposition 1.16

Soit  $L$  une application linéaire de  $E$  dans un espace vectoriel  $F$  de dimension finie. Si  $f$  est dérivable sur  $I$ , alors  $L \circ f$  est dérivable sur  $I$  et :

$$(L \circ f)' = L \circ f'.$$

**Notation :** La fonction  $L \circ f$  est notée  $L(f)$  et de même si  $M : E_1 \times \dots \times E_p \rightarrow F$  est multilinéaire, on note :

$$\begin{aligned} M(f_1, \dots, f_p) &: I \rightarrow F \\ t &\mapsto M(f_1(t), \dots, f_p(t)). \end{aligned}$$

### Proposition 1.17

Soit  $E, F, G$  des espaces vectoriels de dimension finie et  $B$  une application bilinéaire de  $E \times F$  dans  $G$ .

Si  $f : I \rightarrow E$  et  $g : I \rightarrow F$  sont dérivables en  $a \in I$ , alors  $B(f, g)$  est dérivable en  $a$  et :

$$B(f, g)'(a) = B(f'(a), g(a)) + B(f(a), g'(a)).$$

### Proposition 1.18

Soit  $E, F, G$  des espaces vectoriels de dimension finie et  $B$  une application bilinéaire de  $E \times F$  dans  $G$ .

Si  $f : I \rightarrow E$  et  $g : I \rightarrow F$  sont dérivables sur  $I$ , alors  $B(f, g)$  est dérivable sur  $I$  et :

$$B(f, g)' = B(f', g) + B(f, g').$$

**Exemples 1.19 :** • Soit  $\varphi : I \rightarrow \mathbb{K}$  et  $g : I \rightarrow E$  dérivables sur  $I$ , alors  $\varphi \cdot g$  est dérivable sur  $I$  et  $(\varphi g)' = \varphi' g + \varphi g'$ .

- Soit  $f$  et  $g$  dérivables de  $I$  dans un espace euclidien  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ , montrer que :  $t \mapsto \langle f(t), g(t) \rangle$  est dérivable sur  $I$ .
- Soit  $f$  dérivable de  $I$  dans un espace euclidien  $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ . Montrer que si  $\|f\|$  est constante sur  $I$ , alors pour tout  $t \in I$ ,  $f(t)$  et  $f'(t)$  sont orthogonaux.

### Proposition 1.20

Soit  $E_1, \dots, E_p$  et  $F$  des espaces vectoriels de dimension finie ( $p \geq 1$ ) et  $M$  une application multilinéaire de  $E_1 \times \dots \times E_p$  dans  $F$ .

Si  $f_1, \dots, f_p$  sont des fonctions de  $I$  dans  $E_1, \dots, E_p$  respectivement, dérivables en  $a \in I$ , alors  $M(f_1, \dots, f_p)$  est dérivable en  $a$  et :

$$\begin{aligned} M(f_1, \dots, f_p)'(a) &= M(f_1', f_2, \dots, f_p)(a) + M(f_1, f_2', \dots, f_p)(a) + \\ &\quad \dots + M(f_1, f_2, \dots, f_p')(a). \end{aligned}$$

**Remarque 1.21 :** De même pour la dérivabilité sur un intervalle.

**Exemple 1.22 :** Si  $f_1, \dots, f_n$  sont des fonctions dérivables de  $I$  à valeurs dans un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel  $E$  de dimension  $n$ , alors  $\det_{\mathcal{B}}(f_1, \dots, f_n)$  est dérivable sur  $I$  et

$$\left(\det_{\mathcal{B}}(f_1, \dots, f_n)\right)' = \det_{\mathcal{B}}(f_1', f_2, \dots, f_n) + \det_{\mathcal{B}}(f_1, f_2', \dots, f_n) + \dots + \det_{\mathcal{B}}(f_1, f_2, \dots, f_n').$$

Si  $A$  est une fonction dérivable de  $I$  dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , alors  $\det(A)$  est dérivable sur  $I$  et en notant  $C_1, \dots, C_n$  les fonctions colonnes de  $A$  :

$$(\det \circ A)' = \det(C_1', C_2, \dots, C_n) + \det(C_1, C_2', \dots, C_n) + \dots + \det(C_1, C_2, \dots, C_n').$$

### Proposition 1.23

Soit  $I$  et  $J$  des intervalles,  $f : I \rightarrow E$  et  $\varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions telles que  $\varphi(J) \subset I$ .

Si  $\varphi$  est dérivable en  $a \in J$  et  $f$  est dérivable en  $b = \varphi(a)$ , alors  $f \circ \varphi$  est dérivable en  $a$  et :

$$(f \circ \varphi)'(a) = \varphi'(a)f'(\varphi(a)).$$

### Proposition 1.24

Soit  $I$  et  $J$  des intervalles,  $f : I \rightarrow E$  et  $\varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$ .

Si :

1.  $\varphi$  est dérivable sur  $J$ ,
2.  $f$  est dérivable sur  $I$ ,
3.  $\varphi(J) \subset I$ ;

alors  $f \circ \varphi$  est dérivable sur  $J$  et :

$$(f \circ \varphi)' = \varphi' \cdot (f' \circ \varphi).$$

## I. D Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$

### Définition 1.25

Une fonction  $f : I \rightarrow E$  est dite 1 fois dérivable sur  $I$  lorsqu'elle est dérivable sur  $I$  et la dérivée d'ordre 1 de  $f$  est  $f^{(1)} = f'$ , puis par récurrence, pour tout  $k \in \mathbb{N}$  avec  $k \geq 2$ , on dit que  $f : I \rightarrow E$  est  **$k$  fois dérivable** sur  $I$  lorsqu'elle est dérivable sur  $I$  et que sa dérivée est  $k-1$  fois dérivable sur  $I$ . Dans ce cas on appelle **dérivée d'ordre  $k$**  et on note  $f^{(k)}$  la dérivée d'ordre  $k-1$  de  $f'$ .

**Remarque 1.26 :** Toute fonction  $f : I \rightarrow E$  est 0 fois dérivable sur  $I$  et  $f^{(0)} = f$ .

### Définition 1.27

Soit  $f : I \rightarrow E$ .

- Soit  $k \in \mathbb{N}$ , la fonction  $f$  est dite **de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$**  lorsque  $f$  est  $k$  fois dérivable sur  $I$  et  $f^{(k)}$  est continue sur  $I$ .
- La fonction  $f$  est dite **de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $I$**  lorsqu'elle est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$  pour tout  $k \in \mathbb{N}$ .

**Notation :** Pour  $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ , on note  $\mathcal{C}^k(I, E)$  l'ensemble des fonctions de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$  à valeurs dans  $E$ .

Dans la suite de cette partie,  $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ .

### Proposition 1.28

Soit  $f, g \in \mathcal{C}^k(I, E)$  et  $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ .

Alors  $\lambda f + \mu g \in \mathcal{C}^k(I, E)$  et si  $k \in \mathbb{N}$  :

$$(\lambda f + \mu g)^{(k)} = \lambda f^{(k)} + \mu g^{(k)}.$$

### Proposition 1.29

Soit  $L$  une application linéaire de  $E$  dans un espace vectoriel  $F$  de dimension finie.

Si  $f \in \mathcal{C}^k(I, E)$ , alors  $L \circ f \in \mathcal{C}^k(I, F)$  et si  $k \in \mathbb{N}$  :

$$(L \circ f)^{(k)} = L \circ f^{(k)}.$$

### Proposition 1.30

Soit  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$  et  $f : I \rightarrow E$ .

La fonction  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$  si et seulement si chacune de ses fonctions coordonnées dans la base  $\mathcal{B}$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$ .

Dans ce cas, si l'on note  $f_i$  ces fonctions coordonnées :

$$f^{(k)} = \sum_{i=1}^n f_i^{(k)} e_i.$$

### Proposition 1.31 (Formule de Leibniz)

Soit  $E, F, G$  des espaces vectoriels de dimension finie et  $B$  une application bilinéaire de  $E \times F$  dans  $G$ .

Si  $f : I \rightarrow E$  et  $g : I \rightarrow F$  sont de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$ , alors  $B(f, g)$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$  et :

$$B(f, g)^{(k)} = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} B(f^{(j)}, g^{(k-j)}).$$

**Proposition 1.32**

Soit  $E_1, \dots, E_p$  et  $F$  des espaces vectoriels de dimension finie ( $p \geq 1$ ) et  $M$  une application multilinéaire de  $E_1 \times \dots \times E_p$  dans  $F$ .  
Si  $f_1, \dots, f_p$  sont des fonctions de  $I$  dans  $E_1, \dots, E_p$  respectivement, de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$ , alors  $M(f_1, \dots, f_p)$  de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I$ .

**Proposition 1.33**

Soit  $I$  et  $J$  deux intervalles, et deux fonctions  $f \in \mathcal{C}^k(I, E)$  et  $\varphi \in \mathcal{C}^k(J, \mathbb{R})$  telles que  $\varphi(J) \subset I$ .  
Alors  $f \circ \varphi$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $J$  à valeurs dans  $E$ .

## II Intégration sur un segment

Dans cette section, les fonctions sont définies sur un segment  $[a; b]$  (avec  $a < b$ ) et à valeurs dans  $E$ .

### II. A Fonctions continues par morceaux

**Définition 2.1**

Une fonction  $f : [a; b] \rightarrow E$  est dite **continue par morceaux** sur  $[a; b]$  lorsqu'il existe une subdivision  $(a_0, \dots, a_p)$  de  $[a; b]$  telle que pour tout  $i \in \llbracket 0; p-1 \rrbracket$ ,  $f|_{]a_i; a_{i+1}[}$  est prolongeable en une fonction continue sur  $[a_i; a_{i+1}]$ .  
Une telle subdivision est dite **adaptée** à  $f$ .

**Remarque 2.2 :** Une fonction est continue par morceaux si et seulement si il existe une subdivision  $(a_0, \dots, a_p)$  de  $[a; b]$  telle que :

- pour tout  $i \in \llbracket 0; p-1 \rrbracket$ ,  $f$  est continue sur  $]a_i; a_{i+1}[$ ;
- pour tout  $i \in \llbracket 1; p-1 \rrbracket$ ,  $f$  a des limites (finies) à gauche et à droite en  $a_i$ ;
- $f$  a une limite (finie) à droite en  $a = a_0$  et à gauche en  $b = a_p$ .

**Notation L101 :** on note  $\mathcal{C}_m([a; b], E)$  l'ensemble des fonctions continues par morceaux sur  $[a; b]$  à valeurs dans  $E$ .

**Exemples 2.3 :** • Les fonctions continues sur  $[a; b]$  sont continues par morceaux sur  $[a; b]$ ;  
• les fonctions en escalier sur  $[a; b]$  sont continues par morceaux sur  $[a; b]$ ;

**Proposition 2.4**

Une fonction  $f : [a; b] \rightarrow E$  est continue par morceaux sur  $[a; b]$  si et seulement si chacune de ses fonctions coordonnées est continue par morceaux sur  $[a; b]$ .

**Proposition 2.5**

Soit  $f \in \mathcal{C}_m([a; b], E)$ , alors  $f$  est bornée sur  $[a; b]$ .

**Proposition 2.6**

L'ensemble  $\mathcal{C}_m([a; b], E)$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{F}([a; b], E)$ .  
L'application  $f \mapsto \|f\|_\infty = \sup_{t \in [a; b]} \|f(t)\|$  définit une norme sur  $\mathcal{C}_m([a; b], E)$ .

### II. B Intégrale d'une fonction continue par morceaux

**Définition/Proposition 2.7**

Soit  $f \in \mathcal{C}_m([a; b], E)$  et  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ . On note  $f_1, \dots, f_n$  les fonction coordonnées de  $f$  dans  $\mathcal{B}$ .

Alors le vecteur

$$I = \sum_{i=1}^n \left( \int_a^b f_i(t) dt \right) \cdot e_i$$

ne dépend pas de la base de  $E$  choisie. On l'appelle **l'intégrale de  $f$  sur  $[a; b]$** .

**Notation :** L'intégrale de  $f$  sur  $[a; b]$  est notée :  $\int_{[a; b]} f$  ou  $\int_a^b f$  ou  $\int_a^b f(t) dt$ .

On étend les notations  $\int_a^b f$  et  $\int_a^b f(t) dt$  pour un couple  $(a, b) \in I^2$  avec  $f$  continue par morceaux sur  $I$  par :

$$\int_a^a f = 0 \quad \text{et} \quad \int_a^b f = - \int_b^a f \quad \text{si } a > b.$$

### II. C Propriétés

**Proposition 2.8 (Linéarité)**

L'application  $f \mapsto \int_a^b f$  est linéaire de  $\mathcal{C}_m([a; b], E)$  dans  $E$  :

$$\forall f, g \in \mathcal{C}_m([a; b], E), \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \int_a^b \lambda f(t) + \mu g(t) dt = \lambda \int_a^b f(t) dt + \mu \int_a^b g(t) dt.$$

**Proposition 2.9 (Relation de Chasles)**

Soit  $f : I \rightarrow E$  continue par morceaux sur  $I$  et  $a, b, c \in I$ , alors :

$$\int_a^c f(t) dt = \int_a^b f(t) dt + \int_b^c f(t) dt.$$

**Proposition 2.10**

Si  $f \in \mathcal{C}_m([a; b], E)$  et  $L \in \mathcal{L}(E, F)$  avec  $F$  un espace vectoriel de dimension finie, alors  $L(f) \in \mathcal{C}_m([a; b], F)$  et :

$$L \left( \int_a^b f \right) = \int_a^b L(f).$$

**Définition 2.11**

Soit  $f \in \mathcal{C}_m([a; b], E)$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ , on appelle **somme de Riemann d'ordre  $n$  associée à  $f$**  le vecteur :

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f \left( a + k \frac{b-a}{n} \right).$$

**Théorème 2.12**

Soit  $f \in \mathcal{C}_m([a; b], E)$ , alors :

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f \left( a + k \frac{b-a}{n} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f.$$

**Méthode 2.13**

On peut toujours se ramener au cas particulier  $[a; b] = [0; 1]$  qui est plus simple à mettre en oeuvre :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f \left( \frac{k}{n} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f(t) dt.$$

Il suffit alors de :

- faire apparaître  $\frac{1}{n}$  en tête ;
- se ramener à une somme de 0 à  $n-1$  ;
- faire apparaître les  $\frac{k}{n}$  ;
- en déduire la fonction  $f$  associée.

**Exemples 2.14 :** Calculer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=0}^{n-1} k^2 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$$

**Proposition 2.15 (Inégalité triangulaire)**

Soit  $f \in \mathcal{C}_m([a; b], E)$  (avec  $a < b$ ), alors :

$$\left\| \int_a^b f \right\| \leq \int_a^b \|f\|.$$

**Corollaire 2.16**

Soit  $f \in \mathcal{C}_m([a; b], E)$ , alors :

$$\left\| \int_a^b f \right\| \leq (b-a) \|f\|_\infty.$$

**II. D Intégrale fonction de sa borne supérieure****Théorème 2.17**

Soit  $f \in \mathcal{C}(I, E)$  et  $a \in I$ . Alors l'application

$$F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$$

est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$  et  $\forall x \in I, F'(x) = f(x)$ .

**Remarques 2.18 :** •  $F$  est la primitive de  $f$  qui s'annule en  $a$ .

- Si  $g$  est une primitive de  $f$  sur  $I$  et  $a, b \in I$ , alors

$$\int_a^b f(t) dt = g(b) - g(a).$$

- Si  $f \in \mathcal{C}^1(I, E)$  et  $a, x \in I$ , alors :

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt.$$

**Méthode 2.19**

Pour étudier une fonction du type :  $x \mapsto \int_{u(x)}^{v(x)} \varphi(t) dt$ , définie par une intégrale dont seules les bornes (et non l'intégrande) dépendent de la variable, on introduit une primitive de l'intégrande.

**Exemple 2.20 :** On considère la fonction  $f$  définie par :

$$f : x \mapsto \int_{x-1}^{x^2} \frac{1}{\ln(t)} dt.$$

1. Déterminer l'ensemble de définition  $\mathcal{D}$  de  $f$ .
2. Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathcal{D}$  et calculer  $f'$ .

**Proposition 2.21 (Changement de variable)**

Soit  $f \in \mathcal{C}(I, E)$  et  $\varphi \in \mathcal{C}^1(J, \mathbb{R})$  telles que  $\varphi(J) \subset I$ . Pour tous  $a, b \in J$  :

$$\int_a^b \varphi'(s) f(\varphi(s)) ds = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(t) dt.$$

**Théorème 2.22 (Inégalité des accroissements finis)**

Soit  $f \in \mathcal{C}(I, E)$  telle que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur l'intérieur de  $I$  et  $M \in \mathbb{R}^+$ .  
Si :  $\forall t \in \overset{\circ}{I}, \|f'(t)\| \leq M$ , alors :

$$\forall a, b \in I, \|f(b) - f(a)\| \leq M |b - a|.$$

**Attention :** L'égalité des accroissements finis, valable pour  $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ , ne se généralise pas aux fonctions à valeurs complexes ou vectorielles.

**Contre exemple 2.23 :**  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, t \mapsto e^{it}$ .

### III Formules de Taylor

**Théorème 3.1 (Formule de Taylor avec reste intégral)**

Soit  $f \in \mathcal{C}^{p+1}(I, E)$  et  $a, b \in I$ , alors :

$$f(b) = \sum_{k=0}^p \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-t)^p}{p!} f^{(p+1)}(t) dt.$$

**Théorème 3.2 (Inégalité de Taylor-Lagrange)**

• Soit  $f \in \mathcal{C}^{p+1}(I, E)$  et  $a, b \in I$

$$f(b) = \sum_{k=0}^p \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + R_p$$

avec  $\|R_p\| \leq \frac{|b-a|^{p+1}}{(p+1)!} M_{p+1}$  où  $M_{p+1}$  est un majorant de  $\|f^{(p+1)}\|$  sur  $[a; b]$  (ou sur  $[b; a]$ ).

• Soit  $f \in \mathcal{C}^p(I, E)$  et  $a, b \in I$

$$f(b) = \sum_{k=0}^p \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + R_p$$

avec  $\|R_p\| \leq \frac{|b-a|^p}{(p)!} K_p$  où  $K_p$  est un majorant de  $\|f^{(p)} - f^{(p)}(a)\|$  sur  $[a; b]$  (ou sur  $[b; a]$ ).

**Remarque 3.3 :**  $\|f^{(p+1)}\|$  est continue sur le segment  $[a; b]$  (ou  $[b; a]$ ) donc majorée.

**Théorème 3.4 (Formule de Taylor-Young)**

Soit  $f \in \mathcal{C}^p(I, E)$  et  $a \in I$ , alors :

$$f(x) = \sum_{k=0}^p \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + o_{x \rightarrow a}((x-a)^p).$$

**Remarques 3.5 :** • La conclusion du théorème peut se traduire par : il existe une fonction  $\varepsilon : I \rightarrow E$  telle que  $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0_E$  et

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + (x-a)^p \cdot \varepsilon(x).$$

- Pour  $p \geq 1$ , le résultat reste vrai sous l'hypothèse (plus faible) :  $f$  est  $p$  fois dérivable sur  $I$ .

**Méthode 3.6**

- La formule de Taylor-Young décrit le comportement local de la fonction  $f$  autour de  $a$ . Elle peut servir dans un calcul de limite en  $a$ .
- Les formules de Taylor avec reste intégral et l'inégalité de Taylor-Lagrange sont des résultats globaux : valables pour tout  $b \in I$ .

## IV Intégration et dérivation d'une suite ou série de fonctions

### IV. A Intégration d'une limite uniforme sur un segment

#### Théorème 4.1

Soit  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de fonctions définies sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$  et à valeurs dans  $E$ ,  $a$  un point de  $I$ .

Si :

- $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$  est continue sur  $I$  ;
- $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge uniformément sur tout segment de  $I$  vers une fonction  $f$ .

Alors la suite  $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge uniformément vers  $F$  sur tout segment de  $I$  où pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$F_n : x \mapsto \int_a^x f_n(t) dt \text{ et } F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt.$$

#### Corollaire 4.2

Soit  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de fonctions définies sur un segment  $[a; b]$ .

Si :

- $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$  est continue sur  $[a; b]$  ;
- $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge uniformément sur  $[a; b]$  vers une fonction  $f$ .

Alors  $f$  est continue sur  $[a; b]$  et :

$$\int_a^b f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt.$$

**Attention :** La convergence simple ne suffit pas !

### IV. B Dérivation d'une suite de fonctions

#### Théorème 4.3

Soit  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de fonctions définies sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$ , à valeurs dans  $E$ . Si :

- pour tout  $n \in \mathbb{N}, f_n \in \mathcal{C}^1(I)$  ;
- $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge simplement vers  $f$  sur  $I$  ;
- $(f'_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge uniformément vers  $g$  sur tout segment de  $I$  ;

alors :

- $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge uniformément vers  $f$  sur tout segment de  $I$  ;
- $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$  et  $f' = g$ .

**Remarque 4.4 :** En pratique, on vérifie la convergence uniforme de  $(f'_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sur des intervalles adaptés à la situation.

**Attention :** La convergence uniforme doit être celle des dérivées !

### IV. C Intégration et dérivation d'une série de fonctions

#### Proposition 4.5

Soit  $\sum f_n$  une série de fonctions définies sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$  et à valeurs dans  $E$ ,  $a$  un point de  $I$ .

Si :

- $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$  est continue sur  $I$  ;
- $\sum f_n$  converge uniformément sur tout segment de  $I$  vers une fonction  $S$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et tout  $x \in I$ , on pose :

$$F_n : x \mapsto \int_a^x f_n(t) dt \text{ et } T : x \mapsto \int_a^x S(t) dt.$$

Alors la suite  $\sum F_n$  converge uniformément vers  $T$  sur tout segment de  $I$ .

#### Proposition 4.6

Soit  $\sum f_n$  une série de fonctions sur un segment  $[a; b]$  et à valeurs dans  $E$ .

Si :

- $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$  est continue sur  $[a; b]$  ;
- $\sum f_n$  converge uniformément vers une fonction  $S$  sur  $[a; b]$ ,

alors :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left( \int_a^b f_n(t) dt \right) = \int_a^b S(t) dt = \int_a^b \left( \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) \right) dt.$$

#### Proposition 4.7

Soit  $\sum f_n$  une suite de fonctions définies sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$ , à valeurs dans  $E$ . Si :

- pour tout  $n \in \mathbb{N}, f_n \in \mathcal{C}^1(I)$  ;
- $\sum f_n$  converge simplement sur  $I$  ;
- $\sum f'_n$  converge uniformément sur tout segment de  $I$  ;

alors :

- $\sum f_n$  converge uniformément sur tout segment de  $I$  ;
- $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$  et  $\left( \sum_{n=0}^{+\infty} f_n \right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} f'_n$ .

**Exemple 4.8 :** Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ t &\longmapsto \exp(t \cdot A) \end{aligned}$$

La fonction  $\varphi$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $\forall t \in \mathbb{R}, \varphi'(t) = A \times \exp(tA) = \exp(t \cdot A) \times A$ .

**Remarque 4.9 :** De même pour la généralisation à la classe  $\mathcal{C}^k$ .

## V Fonctions à valeurs réelles (rappels)

### V. A Dérivabilité et extremum

#### Théorème 5.1

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ , si

- $x_0$  est un point intérieur de  $I$  (pas une extrémité);
- $f$  est dérivable en  $x_0$ ;
- $f$  admet un extremum local en  $x_0$ ;

alors  $f'(x_0) = 0$ .

**Attention :** 1. La réciproque est fautive :

$$f'(x_0) = 0 \not\Rightarrow f \text{ a un extremum local en } x_0.$$

Contre exemple : la fonction \_\_\_\_\_.

2. Le théorème ne s'applique pas aux extrémités des  $I$ .

#### Méthode 5.2

Pour chercher les extrema d'une fonction  $f$  dérivable sur  $I$ , il faut s'assurer que ces extrema existent (ce qui est le cas par exemple si  $I$  est un segment); puis on considère les points d'annulation de la dérivée et les extrémités.

### V. B Théorème de Rolle et égalité des accroissements finis

#### Théorème 5.3 (de Rolle)

Soit  $a$  et  $b$  deux réels avec  $a < b$  et  $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue sur  $[a; b]$  et dérivable sur  $]a; b[$ .

Si  $f(a) = f(b)$ , alors il existe  $c \in ]a; b[$  tel que  $f'(c) = 0$ .

**Interprétation géométrique :** sous les hypothèses du théorème, le graphe de  $f$  a au moins une tangente horizontale.

**Interprétation cinématique :** si l'on se déplace sur une route rectiligne et que l'on revient à son point de départ, alors il y a un moment où la vitesse est nulle.

#### Théorème 5.4 (Égalité des accroissements finis)

Soit  $a$  et  $b$  deux réels avec  $a < b$  et  $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue sur  $[a; b]$  et dérivable sur  $]a; b[$ .

Alors il existe  $c \in ]a; b[$  tel que  $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ .

**Interprétation géométrique :** sous les hypothèses du théorème, le graphe de  $f$  a au moins une tangente parallèle à la corde reliant les points du graphe d'abscisses  $a$  et  $b$ .

**Interprétation cinématique :** si l'on se déplace sur une route rectiligne, alors il y a un moment où la vitesse est égale à la vitesse moyenne. Par exemple, si l'on parcourt 5 km en une heure, alors à un instant donné la vitesse est égale à 5 km/h.

### V. C Théorème de la limite de la dérivée

#### Lemme 5.5

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue sur  $I$  et dérivable sur  $I \setminus \{a\}$  et  $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ .

Si  $f'(x) \xrightarrow[x \neq a]{x \rightarrow a} \ell$ , alors  $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ .

#### Théorème 5.6

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ , si :

- $f$  est continue sur  $I$ ,
- $f$  est dérivable sur  $I \setminus \{a\}$ ,
- $f'(x) \xrightarrow[x \neq a]{x \rightarrow a} \ell \in \mathbb{R}$ ,

alors  $f$  est dérivable en  $a$  et  $f'(a) = \ell$ .

#### Théorème 5.7

Soit  $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ , si :

- $f$  est continue sur  $I$ ,
- $f$  est dérivable sur  $I \setminus \{a\}$ ,
- $f'(x) \xrightarrow[x \neq a]{x \rightarrow a} \pm\infty$ ,

alors  $f$  n'est pas dérivable en  $a$  et le graphe de  $f$  a une tangente verticale en  $a$ .

**Exemple 5.8 :** Étudier la dérivabilité de  $x \mapsto x\sqrt{x}$ .

**Théorème 5.9**

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , si :

- $f$  est continue sur  $I$ ,
- $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I \setminus \{a\}$ ,
- $f'(x) \xrightarrow[x \neq a]{x \rightarrow a} \ell \in \mathbb{R}$ ,

alors \_\_\_\_\_

**Exemple 5.10 :** Montrer que  $f : \begin{cases} ]0; +\infty[ & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{\ln(1+x)}{x} \end{cases}$  est prolongeable par continuité en 0, on note encore  $f$  le prolongement sur  $[0; +\infty[$ .  
Montrer que  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0; +\infty[$ .

**Théorème 5.11**

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , si :

- $f$  est continue sur  $I$ ,
- $f$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $I \setminus \{a\}$ ,
- $\forall j \in \llbracket 1; k \rrbracket, f^{(j)}(x) \xrightarrow[x \neq a]{x \rightarrow a} \ell_j \in \mathbb{R}$ ,

alors \_\_\_\_\_

**Exemple 5.12 :** Montrer que la fonction  $f$  de l'exemple précédent est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $[0; +\infty[$ .