4.6 Ecoulements visqueux-Exercice 2

Un fluide incompressible, de masse volumique μ et de viscosité η , s'écoule lentement dans un récipient cylindrique de rayon R et dans un tube capillaire de rayon $a \ll R$.

a-Trouver une relation entre P_{ext} , $P(A)$, g , $h(t)$ et $v(A)$ en négligeant la viscosité dans le récipient. Dans la suite on néglige $v(A)$.

b-On donne le débit volumique dans le tube capillaire $Q = \frac{\pi a^4}{8\eta L} (P(A) - P_{\text{ext}})$. A quoi correspond $\frac{\pi a^4}{8\eta L}$?

c-Trouver l'équation différentielle vérifiée par $h(t)$.

d-Le fluide met $T = 10$ min 10 s pour passer de $h_1 = 15$ cm à $h_2 = 12$ cm.
On donne : $L = 10$ cm ; $a = 1$ mm ; $\mu = 1200$ kg.m⁻³ ; $R = 10$ cm. Déterminer η .

a-On néglige la viscosité, donc on peut appliquer la relation de Bernoulli (écoulement parfait, incompressible, quasi-stationnaire) entre le point A et un point à la surface où la vitesse est quasi-nulle :

$$P(A) + \frac{1}{2} \mu v(A)^2 = P_{\text{ext}} + \mu gh$$

On néglige par la suite $v(A)$ donc : $P(A) = P_{\text{ext}} + \mu gh$

b-Par analogie avec la loi d'Ohm sous la forme $I = GU$, $\frac{\pi a^4}{8\eta L}$ représente la conductance hydraulique.

c-Bilan de volume pour le récipient : $V(t+dt) = V(t) - Qdt$ soit : $\frac{dV}{dt} = -Q$

$$\pi R^2 \frac{dh}{dt} = - \frac{\pi a^4}{8\eta L} (P(A) - P_{\text{ext}}) = - \frac{\pi a^4}{8\eta L} \mu gh$$

D'où l'équation différentielle : $\frac{dh}{dt} + \frac{\mu ga^4}{8\eta LR^2} h = 0$ ou $\frac{dh}{dt} + \frac{h}{\tau} = 0$ avec $\tau = \frac{8\eta LR^2}{\mu ga^4}$

d-La solution est : $h = h_0 \exp(-t/\tau)$ On en déduit : $\frac{h_1}{h_2} = e^{-\frac{t_1 - t_2}{\tau}}$ puis : $\text{Ln} \frac{h_1}{h_2} = \frac{t_2 - t_1}{\tau} = \frac{\mu ga^4}{8\eta LR^2} (t_2 - t_1)$

D'où : $\eta = \frac{\mu ga^4 (t_2 - t_1)}{8LR^2 \text{Ln} \frac{h_1}{h_2}}$ A. N : $\eta = 4.10^{-3}$ Pl